



柏马度胺安全用药须知

（请仔细阅读本须知，按本须知或在医生指导下用药）

【药品商品名】

Bolemide，品名：柏马度胺，通用名：Pomalidomide。

【适应症】

柏马度胺是沙利度胺类似物，与地塞米松联合，用于接受过至少两种先前疗法的多发性骨髓瘤患者，包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂治疗，并且已经证实了在最后一次治疗完成后60天内疾病进展。

【剂量和给药方法】

1、给药方法

- 多发骨髓瘤：一个周期 28 天里的第 1-21 天，每天口服泊马度胺 4mg；在每个周期的第 1、8、15、22 天，每日每次 40mg 地塞米松联合使用；超过 75 岁的老年人，地塞米松的初始剂量为在每个周期的第 1、8、15、22 天每日每次 20mg。重复周期直到疾病进展或毒性不能耐受。

2、剂型规格

- 胶囊，2mg、3mg、4mg。

3、禁忌症：孕妇禁用。

【警告和注意事项】

- **血液学毒性**：最常见 3/4 级不良事件为中性粒细胞减少。监测患者血液学毒性，特别是中性粒细胞减少。

- **肝毒性**：肝衰竭包括致死事件；每个月监测肝功能测试。

- **超敏反应**：已经报道了血管性水肿和严重的皮肤病反应。出现血管性水肿和严重的皮肤病反应停止泊马度胺治疗。

- **肿瘤溶积综合征 (TLS)**：监测患者 TLS 风险（例如有高肿瘤负荷的患者）并采取适当预防。

【不良反应】

最常见不良反应 (≥30%)：疲劳、乏力、中性粒细胞减少症、贫血、便秘、恶心、腹泻、呼吸困难、上呼吸道感染、背痛和发热。



Tongmeng (Lao) Pharmaceutical & Food Co., Ltd.
东盟（老挝）制药与食品有限公司

【储存方法】

遮光、阴凉干燥处。