



凯佐尼安全用药须知

（请仔细阅读本须知，按本须知或在医生指导下用药）

【药品商品名】

Kayzoni，品名：凯佐尼，通用名：Crizotinib。

【适应症】

凯佐尼是一种激酶抑制剂，用于治疗ALK或ROS1阳性的转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者。

【剂量和给药方法】

1、给药方法

- 推荐剂量为250mg，口服，每日2次。
- 肾损伤：对于肾功能严重损伤（肌酐清除率 $<30\text{mL}/\text{min}$ ）无需透析的患者，每日1次口服250mg。

2、剂型规格

- 胶囊，250mg、200mg。

3、禁忌症：无。

【警告和注意事项】

- **肝毒性**：在0.1%的患者中发生了致命的肝毒性。定期监测肝脏。暂停，减量或永久终止凯佐尼。
- **间质性肺病（ILD）/肺炎**：发生于2.9%的患者。出现ILD/肺炎的患者永久停止服用本药。
- **QT间期延长**：发生于2.1%的患者。对于有QTc延长经历或趋向的患者，或正在服用可能延长QT间期的药物的患者，密切监测心电图但电解质。暂停，减量或永久终止凯佐尼。
- **心动过缓**：凯佐尼可能导致心动过缓。定期监测心律但血压。暂停，减量或永久终止凯佐尼。
- **视力严重损伤**：报告约有0.2%的患者。进行眼科评估。视力严重受损的患者停止使用本药。
- **胚胎毒性**：可能导致胎儿损伤。建议采取有效的避孕措施避免潜在的胎儿风险。



【不良反应】

最常见的不良反应（≥25%）：药物不良反应有视力障碍、恶心、腹泻、呕吐、水肿、便秘、转氨酶升高、疲劳、食欲减退、上呼吸道感染、头晕、神经病变。

【储存方法】

遮光、阴凉干燥处。